



FICHA TÉCNICA

INTRODUCCIÓN

FUNGICIDA ANTIOIDIO es un fungicida sistémico de acción preventiva y curativa, de amplio espectro, a base de *tetraconazol*. De alta efectividad y buena persistencia (resistente a la lluvia), se emplea en el control de enfermedades producidas por hongos en cultivos y plantas ornamentales, en particular en el rosal.

Autorizado Uso Doméstico – JARDINERÍA EXTERIOR DOMÉSTICA

COMPOSICIÓN

Tetraconazol, 12.5% p/v

PRESENTACIÓN

Micro emulsión (ME)

Se presenta en:
Botella de 10/100/250 ml

PRINCIPALES APLICACIONES

FUNGICIDA ANTIOIDIO se emplea en el control de las principales enfermedades causadas por hongos en el rosal: antracnosis (mancha negra), roya, oídio.



Mancha negra



Roya



Oídio

También puede aplicarse en diferentes cultivos (frutales de pepita, frutales de hueso, hortícolas (cucurbitáceas, alcachofa, fresales, tomate...), vid para el control de enfermedades como oídio, moteado.

MODO DE EMPLEO-DOSIFICACION

Aplicar en **pulverización foliar normal**, a la dosis de **0.3 ml por cada litro de agua (en función del cultivo – ver cuadro -)**.

USO	AGENTE	Dosis	FORMA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN (Condic. Específico)
Albaricoquero	OIDIO	0,02 - 0,032 %	Realizar un máximo de 3 aplicaciones por campaña mediante pulverización normal con tractor con un intervalo de separación entre las mismas de 10- 14 días desde BBCH 61 (comienzo de floración) hasta BBCH 75 (frutos alcanzan alrededor del 50 % del tamaño varietal final). Dosis máxima 0,32 l/ha.
Alcachofa	OIDIOPSIS	0,02 - 0,04 %	Realizar un máximo de 3 aplicaciones por campaña mediante pulverización normal con tractor con un intervalo de separación entre las mismas de 7- 14 días desde desarrollo de las hojas hasta aparición del órgano floral. Dosis máxima de 0,32 l/ha.
	OIDIO		
Arbustos y pequeños árboles ornamentales	OIDIO	0,02 - 0,04 %	Realizar un máximo de 3 aplicaciones por campaña mediante pulverización normal con lanza (uso profesional) o mediante pulverización normal con mochila (uso amateur) con un intervalo de separación entre las mismas de 7- 14 días desde el inicio de la infestación. Dosis máxima 0,4 l/ha.
Cebada	ROYA PARDA	0,9 - 1 l/ha	Realizar una aplicación por campaña mediante pulverización normal con tractor desde BBCH 40 (hinchamiento de las panículas o espigas) hasta BBCH 69 (fin de la floración). Emplear un volumen de caldo de 200-600 l/ha.
	SEPTORIA	0,6 - 0,9 l/ha	
	OIDIO		
	ROYA AMARILLA	0,9 - 1 l/ha	
Centeno	SEPTORIA	0,6 - 0,9 l/ha	Realizar una aplicación por campaña mediante pulverización normal con tractor desde BBCH 40 (hinchamiento de las panículas o espigas) hasta BBCH 69 (fin de la floración). Emplear un volumen de caldo de 200-600 l/ha.
	OIDIO		
Coníferas	OIDIO	0,02 - 0,04 %	Realizar un máximo de 3 aplicaciones por campaña mediante pulverización normal con lanza (uso profesional) o mediante pulverización normal con mochila (uso amateur) con un intervalo de separación entre las mismas de 7- 14 días desde el inicio de la infestación. Dosis máxima 0,4 l/ha.

USO	AGENTE	Dosis	FORMA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN (Condic. Específico)
Cucurbitáceas de piel comestible	OIDIO	0,02 - 0,04 %	(Solo aire libre excepto pepino que se puede aplicar en invernadero también): Realizar 3 aplicaciones por campaña, mediante pulverización normal con tractor separadas entre sí 7-12 días desde BBCH 60 (inicio de floración) a BBCH 90 (maduración completa). Dosis máxima 0,4 l/ha.
Cucurbitáceas de piel no comestible	OIDIO	0,02 - 0,04 %	(solo aire libre): Realizar 3 aplicaciones por campaña, mediante pulverización normal con tractor separadas entre sí 7-12 días desde BBCH 60 (inicio de floración) a BBCH 90 (maduración completa). Dosis máxima 0,4 l/ha.
Fresal	OIDIO	0,02 - 0,04 %	(solo invernadero) Realizar un máximo de 3 aplicaciones por campaña mediante pulverización manual con lanza con un intervalo de separación entre las mismas de 7-14 días desde BBCH 60 (desde primeras flores abiertas) hasta BBCH 90 (segunda cosecha). Dosis máxima 0,4 l/ha.
Frondosas	OIDIO	0,02 - 0,04 %	Realizar un máximo de 3 aplicaciones por campaña mediante pulverización normal con lanza (uso profesional) o mediante pulverización normal con mochila (uso amateur) con un intervalo de separación entre las mismas de 7-14 días desde el inicio de la infestación. Dosis máxima 0,4 l/ha.
Manzano	OIDIO	0,02 - 0,03 %	Realizar un máximo de 3 aplicaciones por campaña mediante pulverización normal con tractor con un intervalo de separación entre las mismas de 14 días desde el inicio de la infestación. Dosis máxima 0,24 l/ha.
	MOTEADO	0,035 - 0,04 %	
Melocotonero	OIDIO	0,02 - 0,032 %	Melocotonero y nectarino. Realizar un máximo de 3 aplicaciones por campaña mediante pulverización normal con tractor con un intervalo de separación entre las mismas de 10-14 días desde BBCH 61 (comienzo de floración) hasta BBCH 75 (frutos alcanzan alrededor del 50 % del tamaño varietal final). Dosis máxima 0,32 l/ha.

USO	AGENTE	Dosis	FORMA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN (Condic. Específico)
Ornamentales herbáceas	OIDIO	0,02 - 0,04 %	Realizar un máximo de 3 aplicaciones por campaña mediante pulverización normal con lanza (uso profesional) o mediante pulverización normal con mochila (uso amateur) con un intervalo de separación entre las mismas de 7-14 días desde el inicio de la infestación. Dosis máxima 0,4 l/ha.
Palmáceas	OIDIO	0,02 - 0,04 %	Realizar un máximo de 3 aplicaciones por campaña mediante pulverización normal con lanza (uso profesional) o mediante pulverización normal con mochila (uso amateur) con un intervalo de separación entre las mismas de 7-14 días desde el inicio de la infestación. Dosis máxima 0,4 l/ha.
Palmera datilera	OIDIO	0,02 - 0,04 %	Exclusivamente para uso ornamental (no apto para consumo humano). Realizar un máximo de 3 aplicaciones por campaña mediante pulverización normal con lanza (uso profesional) o mediante pulverización normal con mochila (uso amateur) con un intervalo de separación entre las mismas de 7-14 días desde el inicio de la infestación. Dosis máxima 0,4 l/ha.
Peral	MOTEADO	0,035 - 0,04 %	Realizar un máximo de 3 aplicaciones por campaña mediante pulverización normal con tractor con un intervalo de separación entre las mismas de 14 días desde el inicio de la infestación. Dosis máxima 0,24 l/ha.
Remolacha azucarera	OIDIO	0,4 - 0,8 l/ha	Realizar una aplicación por campaña mediante pulverización normal con tractor desde cuando la raíz ha alcanzado el tamaño de la cosecha. Emplear un volumen de caldo de 400-600 l/ha. El follaje no se destinará para alimentación animal.
	CERCOSPORA		
Tomate	CLADOSPORIOSIS	0,04 - 0,06 %	(solo aire libre): Realizar 3 aplicaciones por campaña, mediante pulverización normal con tractor separadas entre sí 8-12 días desde BBCH 60 (inicio de floración) a BBCH 90 (maduración completa). Dosis máxima 0,6 l/ha.

USO	AGENTE	Dosis	FORMA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN (Condic. Específico)
	OIDIOPSIS	0,025 - 0,04 %	(solo aire libre): Realizar 3 aplicaciones por campaña, mediante pulverización normal con tractor separadas entre sí 8-12 días desde BBCH 60 (inicio de floración) a BBCH 90 (maduración completa). Dosis máxima 0,4 l/ha.
Trigo	ROYA PARDA	0,9 - 1 l/ha	Realizar una aplicación por campaña mediante pulverización normal con tractor desde BBCH 40 (hinchamiento de las panículas o espigas) hasta BBCH 69 (fin de la floración). Emplear un volumen de caldo de 200-600 l/ha.
	ROYA AMARILLA		
	OIDIO	0,6 - 0,9 l/ha	
	SEPTORIA		
Triticale	ROYA AMARILLA	0,9 - 1 l/ha	Realizar una aplicación por campaña mediante pulverización normal con tractor desde BBCH 40 (hinchamiento de las panículas o espigas) hasta BBCH 69 (fin de la floración). Emplear un volumen de caldo de 200-600 l/ha.
	OIDIO	0,6 - 0,9 l/ha	
	ROYA PARDA	0,9 - 1 l/ha	
Vid	OIDIO	0,02 - 0,03 %	Realizar 2 aplicaciones por campaña en pulverización normal con tractor o manual con lanza con un intervalo de 14 días, desde desarrollo de las hojas hasta maduración. Dosis máxima de 0,24 l/ha.

Uso	P.S. (días)
Fresal	1
Albaricoquero, Manzano, Melocotonero, Peral, Remolacha azucarera	14
Cucurbitáceas de piel comestible, Tomate	3
Vid	30
Alcachofa, Cucurbitáceas de piel no comestible	7
Arbustos y pequeños árboles ornamentales, Cebada, Centeno, Coníferas, Frondosas, Ornamentales herbáceas, Palmáceas, Palmera datilera, Trigo, Triticale	NP

Tratar de forma preventiva, una vez al mes en primavera. Si las condiciones climáticas (humedad) son favorables al desarrollo de enfermedades o al detectarse los primeros síntomas, tratar cada 12-14 días. Emplear la dosis más alta en caso de tratamientos curativos.

Mojar bien toda la planta. Efectuar el tratamiento a primera hora de la mañana o al atardecer, evitando las horas de mayor insolación.

OBSERVACIONES

FUNGICIDA ANTIOIDIO se trata de un **PRODUCTO FITOSANITARIO**, por lo que A FIN DE EVITAR RIESGOS PARA LAS PERSONA Y EL MEDIO AMBIENTE SIGA LAS INSTRUCCIONES DE USO que aparecen en la etiqueta del producto.

Manténgase fuera del alcance de los niños. Manténgase lejos de alimentos, bebidas y piensos. No respirar los vapores y/o aerosoles. Evítese el contacto con los ojos. Úsense indumentaria y guantes de protección adecuados. En caso de ventilación insuficiente, úsese equipo respiratorio adecuado. En caso de ingestión NO PROVOCAR EL VÓMITO: acúdase inmediatamente al médico y muéstrela etiqueta o el envase. EN CASO DE ACCIDENTE O MALESTAR, ACÚDASE INMEDIATAMENTE AL MÉDICO (SI ES POSIBLE, MUÉSTRELE LA ETIQUETA).